

การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (Referral System)

การให้ผู้ป่วยกินยาวัณโรคจนครบ Course เป็นเรื่องไม่ย่ายนั้ โดยเฉพาะในระยะแรก ซึ่งใช้ระบบยา Long Course (กินยา 18 – 24 เดือน) มีผู้ป่วยขาดยาจำนวนมาก ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาระบบรักษาเป็นระยะสั้น (6 - 8 เดือน) ก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งมีการขาดยาอีก จากการศึกษาคพบว่าผู้ป่วยที่รักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านจะให้ผลการรักษา โดยเฉพาะการรักษาครบ (Complete Rate) และการรักษาหาย (Cure Rate) ดีกว่าพวกที่ต้องเดินทางไกล ดังนั้นการส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน จึงเป็นเรื่องจำเป็น

การส่งต่อ อาจทำได้ 2 วิธี

1. ส่งต่อทันที (Refer) เมื่อตรวจพบผู้ป่วยเป็นวัณโรค ให้ถามความสมัครใจที่จะไปรักษา หากผู้ป่วยเลือกรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สถานพยาบาลที่ตรวจพบผู้ป่วยครั้งแรก ไม่ต้องขึ้นทะเบียนรักษาแต่จะ Refer ให้ผู้ป่วยไปขึ้นทะเบียนรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน

2. รักษาระยะหนึ่งก่อนแล้วจึงส่งต่อ (Transfer) มีผู้ป่วยไม่น้อยที่บอกความสมัครใจว่าจะรักษา ณ สถานพยาบาลที่ตรวจพบ แต่เมื่อรักษาไปประมาณ 2 – 3 เดือน จะขอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 ขึ้นทะเบียนครั้งแรกที่สถานพยาบาลที่ตรวจพบ แล้วจำหน่ายด้วยการ Transfer out


2.2 ไปขึ้นทะเบียนอีกครั้งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเป็น Transfer in

หมายเหตุ :

- ผู้ป่วยที่ Transfer out นี้ สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรก จะต้องติดตามผลการรักษาต่อไป เพื่อที่จะได้ทราบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เรา Transfer out นั้นมีผลรักษาอย่างไร เช่น Cure , complete treatment , died เป็นต้น และต้องมีสมุดควบคุมการ Transfer ด้วย

- ผู้ป่วยที่ไม่ทราบผลการรักษาจริงๆ จึงเป็นกลุ่ม Transfer out TB programe ที่ดีจะมีกลุ่ม Transfer out ในสัดส่วนที่ต่ำ

การส่งต่อผู้ป่วย (Refer)



การ Transfer

