

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

การดูแลแผลช่วงแรกแผลจะบวมๆ เลือดออกบ้างในช่วง 4-5 วันแรก

1 แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ ที่โคนอวัยวะเพศ เด็กจะไม่ปวดแผลประมาณ 2-4 ชั่วโมง หลังจากนั้นอาการปวดรักษาด้วยการให้ยาแก้ปวด Paracetamol ควรให้ยาเด็กบ่อยๆ ทุก 4 ชั่วโมง โดยเฉพาะใน 48 ชั่วโมงแรก เด็กจะปวดแผลประมาณ 2-3 วัน

2 ทำแผลทุกวัน ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านจนครบ 1 สัปดาห์

3 อาจมีสะเก็ดเหลืองติดบริเวณรอยขลิบและปลายอวัยวะเพศสีเหลือง ซึ่งเป็นคราบน้ำเหลืองปกติ การถูkn้ำบ่อยๆ ทำให้สะเก็ดนิ่มและหลุดง่ายอย่าแกะหรือลอกสะเก็ดออกเอง ใช้สำลีสะอาดชุบน้ำต้มสุกหรือน้ำเกลือล้างแผลเช็ดหลังปัสสาวะ

4 วันที่ 5 หลังขลิบควรรอดูหนังส่วนปลายร่นมาหลังอาบน้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันหนังหุ้มปลายติดกับรอยหยักของหัวอวัยวะเพศ

5 ถ้ามีเลือดออกให้กดด้วยสำลีหรือผ้าก๊อซสะอาด 10-15 นาที ถ้าเลือดไม่หยุดควรพบแพทย์ เด็กเล็กหลังผ่าตัด แพทย์อาจไม่พันแผลเพราะอาจทำให้เจ็บตอนเอาผ้าพันแผลออกถ้าพันมักใช้แผ่น Sofra tule พันรองไว้ก่อน 1 ชั้น

6 โทมเย็บ ซึ่งจะละลายหลุดเองภายใน 10-14 วัน

7 พบแพทย์ 1 สัปดาห์ หลังขลิบปลายอวัยวะเพศหรือตามนัด

8 สังเกตอาการเลือดออกมากไม่หยุด ปัสสาวะไม่ออก อาการติดเชื้อแผลผ่าตัดบวมแดง ร้อน อักเสบ บริเวณแผลผ่าตัดให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัด



การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย [CIRCUMCISION]



โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานห้องผ่าตัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล

โทร. 02 - 9884097-99 ต่อ 363

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ (Circumcision)

หรือเรียกกันว่า “การทำสุนัต” คือ การผ่าตัดเพื่อเอาหนังหุ้มปลายของอวัยวะสืบพันธุ์ชายออก จุดประสงค์เพื่อให้สามารถรูดหนังหุ้มอวัยวะเพศให้เปิดและเพื่อการรักษาความสะอาดที่ง่ายขึ้น


เหตุผลทางการแพทย์ของการขลิบ

- 1.หนังหุ้มปลายไม่เปิด (Phimosis)** มีลักษณะของพังพืดบริเวณปลายชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มจะไม่เปิดได้เอง ในเด็กแรกเกิดส่วนใหญ่จะไม่เปิด ทารกร้อยละ 4 หนังหุ้มปลายรูดเปิดได้ หลัง 3 ขวบจะค่อยๆ รูดเปิดได้ และหลังอายุ 5 ขวบ เด็กส่วนใหญ่รูดเปิดหนังหุ้มปลายได้ ร้อยละ 98-99 กระทั่งผู้ชายอายุ 18 ปี สามารถรูดเปิดหนังหุ้มปลายได้
- 2.มีการอักเสบที่ปลายอวัยวะเพศ (Balanitis)** กรณีที่มีหนังหุ้มปลายรูดเปิดยาก หรือไม่ค่อยรูดเปิดทำความสะอาดหรือในบางรายที่แพ้สบู่, น้ำยาซักผ้า เป็นต้น
- 3.ผู้ชายที่มีหนังหุ้มปลายรัดตึง** มีอาการเจ็บเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวหรือเวลามีเพศสัมพันธ์

- 4.ทางเดินปัสสาวะอักเสบ** เป็นๆหายๆ ที่ไม่สามารถหาสาเหตุอื่นได้
- 5.ท่อไตมีลักษณะผิดปกติ** มีปัสสาวะไหลย้อนกลับสู่ไตเมื่อกำลังปัสสาวะ
- 6.เหตุผลทางศาสนาอิสลาม** คริสต์ ยิว ฯ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ สามารถทำโดยการใส่ยาชาเฉพาะที่ แต่ในเด็กเล็กอาจจะต้องดมยาสลบ เพราะเด็กจะต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือ


อาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

- ➔ เลือดออกบริเวณผ่าตัด
- ➔ การอักเสบติดเชื้อแผลผ่าตัด



การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย มีข้อพึงพิจารณามากมาย นอกจากกรณีที่เป็นการขลิบตามหลักศาสนาแล้ว สมควรที่จะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมว่าสมควรจะต้องขลิบหนังหุ้มปลายหรือไม่???

ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปรับคำปรึกษาได้ในโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์ทั่วไป หรือศัลยแพทย์กุมาร



เมื่อทำเสร็จใหม่ๆใหม่ที่เย็บยังอยู่ แต่ละค่อยๆหลุดหรือหายไปเอง